

種痘新書

種痘新書卷之六

三山汀郡寧邑張

琰遜玉氏編輯

受業曾衡波全叅

起脹辨症賦

五六日間痘出齊矣。點至足心。勢方安定。倘有陸續不出之狀。或隱隱于皮膚之間。而不見其起發者。古名不快。若非風寒壅遏之因。必有氣虛不振之過。是故五六日間。痘已出齊。身表宜涼。八九日後。痘欲醺膿。身表宜溫。涼則痘之毒氣。盡出皮膚。而內不留鬱熱。溫則人之血氣。自爾流通。在外易于運化。至此而身不微熱。雖未至于水伏。而痘瘡斷乎弗長。六七日來。痘顯已

成瘡宜肥大而粗。頭要發光而白。方有行漿之勢。若還赤色過頭。雖見嬌紅。有可愛。延綿八日。依然到頭。空壳虛花。其內並無漿影。若皮薄而光亮如燈。內含是水。雖頭尖而眼脚不紅。行漿弗實。如熱毒盛而未解。則爲紫爲黑。癰而不起。則爲陷爲塌。滯而不榮。則爲乾爲枯。爲青爲灰。怯而不振。則爲不快。爲停漿。或有肉先腫脹而痘反不起者。衆則滯而不行。面色虛浮而痘反退伏者。毒則起而不白。身不熱而痘不起。悲成冰伏之形。此際宜行溫藥。氣血弱而不興。悲成陷伏之弊。治此斷用補劑。他如紫色乾枯。切忌溫中滯補。只宜活血鬆肌。若或皮薄漿清。則宜健脾助氣。切勿解毒清涼。爲藥爲滯。烈藥雖然可發透肌。尤恐

夏。方。瘡。世。雖。宜。溫。補。瀉。甚。當。佐。升。提。界。地。不。分。安。能。起。水。焦。枯。不。退。必。致。內。攻。頂。有。亂。紋。宜。解。毒。指。紫。眼。現。是。危。機。此。際。猶。堪。解。毒。急。施。拯。救。之。功。遲。之。二。日。則。難。措。手。遮。何。及。乎。

### 起脹三日調治法

痘。出。皮。膚。要。漸。漸。起。脹。蓋。痘。起。一。分。則。毒。出。一。分。必。痘。脹。滿。而。毒。乃。盡。出。倘。痘。不。起。脹。則。痘。雖。見。點。其。毒。仍。留。臟。腑。數。日。之。後。其。毒。內。攻。不。可。救。矣。故。出。疹。三。日。之。內。其。時。日。十。分。要。緊。急。于。此。時。觀。察。形。色。審。証。用。藥。猶。如。拯。溺。而。不。可。緩。救。焚。而。不。可。遲。也。天。痘。之。安。全。必。要。漿。膿。飽。滿。其。次。亦。要。膿。漿。六。七。分。方。保。無。虞。痘。瘡。既。出。形。色。顯。然。其。膿。之。成。與。不。成。漿。之。足。與。不。足。此。時。

皆可逆。脂。蓋。痘。出。齊。後。潮。熱。已。退。雜。症。又。除。穢。疎。明。朗。六。圓。紅。  
潤。皮。粗。而。厚。體。質。而。堅。者。氣。血。俱。盛。毒。氣。又。清。必。能。起。脹。必。能。  
成。漿。此。固。可。預。知。也。若。或。稍。生。不。順。或。熱。不。退。雜。症。不。除。色。暗。  
而。不。明。勢。弱。而。不。振。界。地。不。分。顆。粒。不。圓。紫。而。不。鮮。焦。而。不。潤。  
淡。而。無。血。薄。而。不。堅。者。非。毒。盛。之。失。解。卽。氣。弱。之。當。扶。此。症。若。  
無。藥。救。則。必。不。能。起。脹。不。能。灌。漿。亦。可。以。先。知。也。故。必。于。此。時。  
力。爲。調。治。猶。可。救。也。失。此。不。治。則。不。能。起。脹。又。安。望。其。成。漿。乎。  
症。之。生。死。決。于。痘。之。起。伏。痘。起。則。毒。從。外。出。而。可。化。痘。伏。則。毒。  
留。內。攻。以。爲。殃。故。起。脹。方。有。生。機。陷。伏。必。從。死。例。此。萬。古。不。易。  
之。論。決。無。倖。全。之。理。此。際。可。不。慎。乎。

論出時發瘡

痘毒有氣而無形。必藉氣以送之。血以載之。毒附于血。達于皮膚。以成痘瘡。故有形也。方出之時。毒與氣血滾爲一團。乃成膿子。及痘既出。則氣充其上。以升毒。血附其下。以化毒。故頂尖而圓者。其氣上升也。腳有紅暈者。其血下附也。分清氣血之時。痘多作痒。及氣血各定其位。則氣上升。以化毒。血下附。以養毒。其痘自不痒矣。痘雖忌痒。惟初出時。痒乃不惧也。

出齊發熱

凡痘出齊。必要退熱。潮熱已退。則毒盡出于皮膚矣。若山勢猶熱。是毒猶少留于內也。出齊大熱。是毒甚滯於中。也。急宜宣毒。

出外毒不留滯則熱自送矣而痘亦自長矣但毒之所以滯留  
亦有兩端。有毒氣壅盛乃滯留而不出者其痘必紅紫鮮焦  
兼之煩悶宜用調元化毒湯以解之若仍不退則用大成散以  
攻之服此而痘光潤起水即熱未盡退亦當更用補劑蓋八九  
日上候當用補不敢復試清涼也。有元虛不能進毒者痘必  
淡白雖見點稀疏其熱不退亦是留毒未出不可玩忽視之必  
宜用千金內托散托出痘毒方可無虞。

痘當出齊宜固肌表安脾胃蓋肌表為痘瘡進化成功之托肌  
表不同則有皮薄漿清潰爛難痂之患故八九日上必用參  
芪炙草以其補氣而實腠理也脾土不堅則有泄瀉下陷之

石月用  
利水之藥

陰虛

治痰法

虞而痘安能起。脹以成漿。故凡滑利下瀉之物。戒之切。其與服且痘當起水之際。又忌利水之劑。雖小便不長。乃津液上升之故。切不可疏利膀胱而通小便。蓋小便太利。則痘疹之水不能起矣。是故木通車前猪苓澤瀉滑石扶神一切利水之藥。此時禁而不用。又恐土能制水。凡補脾之藥。能燥乾津液。其痘必致乾枯。故蒼朮白朮淮山東仁苡仁茯苓柯子藥。虎霍香砂仁一切乾燥除濕之劑。總不宜投。況津液盡行痘內。多外飲而常口干。勿用葛根知母而漸與之止渴。蓋此時忌發表。宜吐清涼也。縱有痰涎止宜用欬冬花粉而南星半夏恐燥烈而漿不行。川貝竹瀝又寒涼而慮壽夭。伏至不得。



用藥法

血熱症

用藥去

留血病

血不實

補血

毒盛時

用藥自

解毒而

兼發毒

外疔起

服藥

已而用芩連八九日來須用參芪監制若有熱而水不沸而  
胡在所必用頭面之痘不起川芎在所必加血熱而界不分  
紫草紅花生地赤芍以及丹皮是活血之聖藥而補血之歸  
茸則禁而莫用蓋血既熱而復補必成一片紅熱或填刻轉  
為焦紫惟血虛而痘不紅則歸茸必當重用兼以川芎白芍  
大元枝以助補血之力而紫草紅花是血虛之忌藥遇此症  
切莫輕投若熱盛而毒壅不起則連喬牛旁地丁慈姑理必  
用之而解毒毒之盛者當用此等以為君略用荆防以達表  
更加陳槓以疏通蟬退提毒上行不可多與多則恐致至驚  
山查宜通滯氣或清或補皆當以之為佐其毒乃不滯留也

發詳生  
聖之宜

又論此  
時忌藥

治頭面  
起脹

甲透裏攻漿或托或解總宜以之爲便。賊毒乃得外宣。若藥雖皆行血之藥。然赤能涼血。白能聚暈。故血熱用赤。六日以前多取赤芍而生用。血散用白。七日以後須用白芍而炒之。黃芪雖最補氣。然生則補中帶發。熟則專收。勝肌甘草雖謂和平。然生則清胃解毒。熟則補氣溫中。是以二者之藥。六日以前生用。七日以後炙施。至于升麻。乾葛。薑活。柴胡。紫蘇。麻黃。防風。荆芥。只壳。檳榔。皆走表散氣之藥。至此皆不敢用。卽不得已而用之。此等但雖少與。亦要兼參芪以扶正氣。而後乃不傷元。他如人中黃。雖善解毒。用此必令人參。始不至於耗本。淫羊藿。雖善攻漿。然亦不敢多服。多則瘕。必生瘕。遍身

法 治四肢  
起脹之  
法 治氣虛  
之症用  
藥 治世渴

和九氣書

起而頭面猶伏則重川芎而加升麻。炒為引用出退而以芎  
尖作湯若頭面起而四肢不脹則去川芎而除桔梗用桂枝  
以達四方若皮薄而軟頂白而平總以氣虛而斷必用人參  
黃芪川芎肉桂以補氣藥為君若或赤色貫頂久而血不下  
附頂不放光亦是氣虛不能統血陰盛陽衰之義宜以扶陽  
為主而參芪丁桂總要多施最忌此時泄瀉瀉則中虛內陷  
頃刻立變白灰此症最為險要必須補氣安脾參芪更加柯  
朮甚則芫花九施雖謂起水忌脾強而急則治標為貴厥本  
苓淮山莫用以柯朮為便宜蓋猛藥方能止泄泄定瘰乃升  
提氣虛下泄待何醫土炒升麻堪瀉提氣上行能止泄

論喉症

論失聲  
咽喉痛  
喉水腫  
食  
以下條  
論喉症

起痘以高飛此方奇妙。少人知。曾經屢驗。休疑。倘或播種。額其間。尚有驚風。真謂痘出此為凶。鎮驚丸。猶堪用。七八日。上或膝臃。未免心經熱。癰。若用寧心補血。定加變症。無功。若夫失聲咽痛。此際不必驚慌。定是喉中有痘。痘脹。故不聲揚。噎水而兼吐飯。總因內痘攔。當追至十日以後。此症一槩。于康。最怕痘陷。伏孩兒。十個九亡。又畏痘色青黑。十日內。返泉鄉。頂焦。終不放毫光。有如瘡。瘡模樣。十日舌上生片。十一日見開。王紅。鞋一片。勢難當。又怕面如錫。盛。蚕形。蚊跡。惡。非常。無藥能醫。此恙。湯泡。燈燒。真治灰黑。二陷。難醫。若是紫白。血陷。此症。尚可維持。此時。雜症。是危。機。勿謂。尋常。容易。腹。肚。

脩言雜  
症凶危

痘症

卷之六

痘症

喘噎痰湧皆為毒陷內攻大小二便來血。不為膿。聚中傷。時張口欲吐。是毒鬱而不祥。漿未行而咬牙寒戰。此症已云難治。痘不起而失智無魂。吾知立見妖亡。目上視而不轉。或牽衣而弄裳。此等已為鬼錄。何須懇禱寧馨。

起脹順症

痘出齊後。執退身涼。飲食得進。精神清爽。體暢心寧。上無咳嗽。吐逆之弊。下無泄瀉秘結之虞。痘稀而朗。顆粒分明。頂尖圓而日起。脹脚不濶而聚紅。暈痘頂放光而起。瘡底帶漿而升。先出者先起脹。痘若出齊至足。而面部水汁俱行。天庭地角綻光。解左右頰腮俱潤澤。水至八分。其脚便有漿漿。乃為順症。

夫更爲氣強血盛此等易發易醫尤爲至美之精其欲醫升  
灌亦爲敢言之痘吉症何須用藥只要飲食調和起居謹慎自  
獲平安切莫妄服藥餌恐庸醫反致誤人又莫冒犯穢氣寒邪  
邪而觸內毒且肥滑不宜與服恐滑利而生泄瀉以犯痘敗之  
忌生冷不可與食恐冰滯而生腹痛以致終身之疾此保赤之  
良言故向天下而致囑

凡遇順症自不藥而愈不必強而治之 余見一兒痘出雖多  
而皆起脹余謂安然無事矣二日未嘗往視一庸醫見是兒數  
日未嘗大便遂與下藥一服未泄又進一服孰知一泄之餘痘  
遂倒陷此輕症變重之故雖出庸醫之誤亦其父母不慎之過

也。藥能救人亦能殺人而可冒昧以用乎。

### 起脹險症

夫痘之起脹雖在六日之後而其調治之藥當施於七日之前。蓋痘之所以難起者必是毒盛痘稠也。凡解毒之藥多是清涼。惟七日以前可用。若八九日上候當用補毒。若未清則畏首畏尾難施治矣。故于六七日間毒之甚者急宜解之。斷不可稍遲延也。

痘之毒氣出於臟腑。氣血拘攣。送于皮膚。故成瘡形。初出乃是血點。其後漸漸運化。血化爲水。水化爲膿。必漿足膿成。毒乃化盡。然必出於皮膚而毒始能化也。故痘必起而水乃行。水將行

則痘光潤是以痘宜光而不宜暗宜滑而不宜澀。痘起而不化。伏究痘之起與不起。毒之化與不化。皆氣血盈虛之故。邪正盛衰之由也。必正氣盛而邪氣衰。陰陽調和。血氣通暢。乃能化腐以成漿。

一有痘色紅紫而焦枯者。乃毒氣熾盛。血燥而凝。不能起脹而化也。宜用清毒活血湯主之。

### 清毒活血湯

前胡 紫葳八分 當歸 生地七分 白芍八分 木通五分 牛子 連翹八分 桔梗 炒芩 炒連四分 山查八分 甘草三分 人參四分 生芪八分 渴蝦八分

各製粉



又有瘡色淡白泡不失圓根無紅暈而不起脹者乃元氣虛弱血寒而縮不能送毒外化以行漿也宜用參歸鹿茸湯或千金內托散

參歸鹿茸湯

人參一錢 炙甘草六分 鹿茸三錢 當歸各一錢 五加皮

右方大補氣血托膿之劑莫妙如此用生薑龍眼引

手足冷加木香三分 丁香肉桂五分 寒戰咬牙加肉桂附子

他處加白芍豆蔻柯子木香丁香肉桂另用參朮調肝散或

耳寇丸以止泄二方俱見散篇

千金內托散

人參

當歸

炙芪

各一錢五分

白芷

肉桂

川芎

熟地

黃連

山查

白芷

木香

防風

厚朴

各三

凡痘須看面部蓋面乃五臟元陽之會面部若起則毒氣雖陷亦氣血灌既未至以藥力扶之自能徐徐而起也蓋面部之痘不起而手足之痘先脹者此陽氣不能上升而流於四肢最為凶兆急用十金內托多用川芎加升麻以提氣上升必頭面起脹方保無虞凡面部又以天庭為要緊天庭諸陽之首此處不起則元陽已衰諸部安能運化急用升天散治之

升天散

人參分六黃芪分八

當歸分六

川芎分六

陳皮分五

澤瀉分四

葶藶分三

甘草分三

附桂分五

川甲分二

木香分三

加桔梗分四

凡痘方起脹而即帶黃膿者此毒火熾甚故易成膿俗號揔漿痘不拘何處俱急剔破去其膿膿以拔疔散敷之不然能開漿路令諸痘不能成漿又或間有紫泡黑泡血泡者俱是毒盛血滯為惡類之標若不速除能引諸痘皆成此泡亦宜刺出惡血仍以拔疔散敷之

一痘已半起忽然平塌者此是元氣本虛或為風寒所觸或為穢氣所冲或誤服寒涼所致必宜詳審其由為風邪觸者其

必惡風而皮毛慄起用生薑附子桂枝令出微汗而痘復起  
誤服寒涼者其痘必白用內托散加丁香附子而補中氣則  
痘復起為穢氣所冲者其痘必痒用平和湯方見五卷外  
以沉檀末核蘸之其痘即起

一痘初出紅活起脹時忽然而變紫黑者此必以前失于解毒  
而毒留滯于中至此將作內攻最為危險速用入牙散或大  
戒散

### 入牙散

人牙白落者火煨存性入韭菜汁淬之為末加麝香二川用  
二用雞冠血荻白煎酒調服

一痘雖鮮紅充乾燥而不肥潤者此毒火盛而陰血不足也宜滋陰退火用

兩物快癍湯

當歸 川芎 赤芍 生地 紫草 連翹 牛子 前胡 全地

一痘雖光肥而帶濕者乃脾中有風濕也不治則成潰爛宜用西君子快班湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 炙草 肉桂 防風 陳皮 白芷 白芍

一痘雖紅活充滿而皮薄嬌紅擦之即破者此血有餘而氣不

足也。若不急治，十日上必瘳。塌擦破而死，須用保命丹治之。

人參錢一 黃芪錢一 當歸錢一 生地錢八 川芎錢七 赤芍錢七 牛子錢七

連翹七 防風三分 肉桂五分 白木八分 淮山七分 加無價散即人

煨存性  
爲末

一、瘳肉傷飲食，腹中飽脹而腹高者，此中氣爲食積所滯，不能宣暢其瘳，故不起也，宜用

### 寬中快瘳湯

陳皮 厚朴 山楂 神麴 川芎 白芷 砂仁 木香

香附 炙草

一、瘳遍身俱起而手足不起者，乃脾氣弱而不能灌，既四肢也。

用補脾快癰湯

人參 黃芪 炙草 丁香 防風 防己 薄荷

一遇天時暄熱又加包裏以致毒火遏鬱而不起者宜用

白虎快癰湯

人參 石膏 甘草 麥冬 升麻 竹葉 小便赤而昏

迷用定心散

慢食生冷致脾虛不能起發者用

理中快癰湯

人參 白朮 黃芪 炙草 肉桂 木香 丁香 干薑

泄瀉加肉蔻柯子

痘有四圍高起而中心落陷者有輕有重。痘稀者輕。痘密者重。此皆中氣不足之故。宜用內托散以托之。而中亦自起矣。若中心陷而黑者。此毒留于裏。中氣鬱而不升也。宜理中而兼化毒。若不急治。必成凶。亮空瘠而死。須用 人參 黃芪 當歸 白芍 川芎 生子 連翹 人中黃 川甲 防風 加無價散及雄黃。若黑硬乾枯而中陷者。是痘疔也。急宜射破。吮去惡血。以拔疔。救敗之。仍用前方。與服。不然。但變黑陷而死矣。

又有中心微起而含水意。其四畔却乾枯者。此毒入蘊。蒸津液。將枯之兆。必身熱煩燥。若不急治。則盡焦枯而死矣。宜仍用



前方加前胡麥冬治之

凡痘出昏迷不省人事者用神砂一錢冰片腦一分麝香三加猪尾  
血溫酒調勻與服自毒解神寧此方果效

一見痘齊而熱不退昏況失智不省人事諸藥不效余用六成  
散一服發出臭汗一身遂退熱人甦痘亦明朗

凡痘之不起總因毒重痘密而見點之際又或失于調治致毒  
滯不發而氣血又難舒暢故痘不能起也

一見出痘形如蚕種狂言謔語智見鬼神余曰此惡候也其痘  
方出即用和中敗毒散一日連進四服其後心雖稍明而痘  
不分界地一片通紅乃用紫葺生地赤芍丹皮

前胡 生子 連翹 川芎 麥冬 黃芩 木通 甘草  
 一日進三四服。次日則界地已清。形若荔枝。又於前方去  
 赤芍 麥冬 木通 加白芷 白芍 川芎。外用水柳煎  
 煎水頻頻拭之。則痘色漸漸光亮。見熱症稍平。遂於前方加  
 生芪以扶元氣。至九日上。乃用人參 炙芪 當歸 川芎  
 鹿茸 白芍 白芷 山查 川甲 肉桂 炙草 每日  
 必進二三服。然後升水燉漿。至漿水既足。復加淮山白芍。其  
 漿乃膿。但痘總以氣血為主。氣血若旺。則可縱橫解毒。毒氣  
 既清。則氣血不凝。故能起脹發光。于是用補以托其膿。投劑  
 可以立效。故雖稠密如麻。亦或可救。然解毒之藥。斷不可用。

石羔知母黃柏黃枝大黃麻黃等藥恐傷脾胃虛肌表至起  
脹時有泄瀉下陷之虞皮薄漿清之患也必慎之于始方不  
悔之于終勿圖目前之效而不顧成功之難也 古方書所  
載水楊柳是木余所用水柳是草生于溪澗水邊其葉如柳  
其莖春時青至夏末秋初則赤矣條條直上不分枝極至秋  
略舍赤花凡痘焦紫乾枯者以此洗之立見光亮藥水卽行  
其效如神已洗之後若往視之則已洗未洗之處其明潤焦  
暗形色判然取水行漿之效孰有速於此者但須用巾蘸其  
藥水頻頻與拭必水足而後已也若秋冬葉落取枝用之其  
性涼血解毒可治跌打損傷痲瘋瘰癧疫

一見痘出稠密悶亂不寧痘色慘暗紫將變黑而清毒清血  
方用盡總不見效時至八日症甚危急余思此毒氣密于血  
分當解血分之毒乃用紫草茸六分人中黃六分人參三分  
與服及過一時則痘之黑者已轉紫色又進一服則紫轉紅  
活略有光矣遂連進四五服痘盡起脹行漿蓋紫草茸涼血  
活血能解血分之毒人中黃是解痘毒之極品人參最補元  
氣藥不雜而效乃速也余因立其方名紫茸飲

### 五陷治法

痘出齊後當治不治則五陷之症作矣夫五陷者紫陷而陷白  
陷灰陷與血陷也紫黑二陷其症屬熱白灰二陷其症屬虛惟

血陷乃是氣虛不能領血毒而外化故紫黑宜清自赤宜補血陷則專補氣此調治之大要又當詳分其目也

夫紫陷之症必毒盛血熱初見之時其色深紅而無滯其人煩燥口渴二便不利大熱不退此時失于解利則毒滯血燥凝滯于內不能上升而運化遂變紫色而陷伏紫陷失治必成黑陷至于黑陷則乾枯焦槁毒入內攻不可救矣蓋痘毒出于臟腑既出皮膚須在外面成漿結痂其毒乃化若不能運化成漿則必倒流入裏其痘形故陷也試看痘陷之症其孔深入寸許直透骨髓是可知毒由臟出而復陷入臟也善治痘者其毒一到皮膚即觀察形色急爲救療如拯溺救焚

容補緩恐其毒陷而難救也。方其痘色紅紫，即用清涼解毒之藥。一日連進數劑，必痘轉紅活，而有潤澤，乃另設行漿之法。此見機先達之良醫也。若至于紫陷黑陷，亦必以涼血解毒為主，毒清血活，其痘乃起。切不可用補劑，蓋補則毒愈甚而血愈涸也。宜用

絲瓜化毒湯

絲瓜乾

取近蒂五寸以此為君

赤芍

紅花

當歸

紫草

川芎

牛子

連翹

升麻

甘草

黑豆

赤小豆

等分

煎服

犀角調服。氣弱者加人參用此不起，則用小靈丹。

小靈丹

硃砂

雄黃各一錢

乳香

沒藥各一錢

大蟾酥取心所焙

麝香

分一人中黃錢四

共為末取猪心血雞冠血和勻為丸以

紫草煎湯送下服此不效無生理矣

又或用無價散以無

兒之蜚陰于然後加冰片研入以紫草煎水調服弱者加人

用火煨存性為末

參

又或用紫黃飲

方見前

又方用

桃花

錢二

梅花

一絲

瓜錢五

硃砂

二錢

人中黃

錢二共為末以紫草人參煎水調服

又方

龍虎丹

天靈蓋

錢三

川印

錢四

辰砂

錢六

麝香

分五錢共為末以紫草麻黃升麻荔枝壳煎蒸和蜜入末為丸酒下

以上數方皆起紫黑二陷危亡之症須預脩以救急危

又用水柳草煎水外浴治此之法至詳至悉如諸方不效是  
天命之當妖而毒已內傷其臟也

如百陷者痘自而陷也灰陷者痘色如灰而陷也此皆氣血兩  
虛之症蓋白者血虧陷者氣弱至于灰陷則氣血愈損將不  
保矣治此之法必大補血氣為主宜用參歸鹿茸湯或千金  
內托散見前方有泄瀉加豆蔻柯子有寒戰加附子泡薑丁  
香但陷伏之症其血病已甚如巨寇入關非良將重兵不能  
與敵且非一戰而可成功故余遇此症藥必重劑人參鹿茸  
至少之劑必用一錢更不于一二服中而期其效必連進數



劑乃可見功。昔余治一灰陷以千金散加鹿茸初服用人參一錢次二三服用參二錢是日連進五劑而痘不起。諸人皆曰不可救矣。或其藥宜更乎。余曰不然。此方對症。故無變遷。痘未起者藥力未到故也。宜再服之。至次日黎明痘起而藥行矣。余見世人輒謂參茸貴重。不肯多用。每服不過數分。見一二劑藥未效。則曰藥力無功。是以一杯之水救車薪之火。火之不息。豈水之無能哉。皆惜財而不惜命之咎也。可不悲乎。

還魂丹

治灰白二陷有起死回生之力。七日至十二日但可用。

大靈蓋

初生者佳。用米泔水洗淨。朱砂二兩。人參二兩。山查二兩。炙酥二兩。入猪鬃同煎。不不兩。

黃芪四兩兩當歸四兩兩白朮二兩兩青皮二兩兩麥冬二兩兩紫草二兩兩陳皮各二兩兩附子一兩兩豆蔻五錢錢炙甘草八錢錢紅花一兩兩以上諸藥俱用好酒煮糯米四兩用丁香五錢錢米人乳二碗碗童便二碗碗二味入天靈蓋與硃砂煮于官桂一兩兩先用一宿

以上諸藥古方教人將靈蓋硃砂二味逐漸入諸藥高煮以乾為度。兼諸藥查單取靈蓋硃砂研末為丸。用兔血調勻。作丸如菜豆。大金箔為衣。入磁罐內。以黃泥封口。埋土中。一七。然後取出。用七口內用七丸。八日則用八九滴雞冠血調酒。服之。將被覆蓋。取微汗為度。少時痘自紅活。愚製此丹。先將靈蓋硃砂入人乳。慢火煮干。炙酥。再將童便入二藥煮干。

炙酥研末。然後將諸藥各味逐漸濃熬至水無少許。乃去藥渣。入二味藥末攪勻。令受藥水。或晒或焙。再入別藥。如別藥受藥水。惟入參。臨時加入。煎湯送下。如此製法。受諸藥性。更透。但艱於時日也。

回生丹 治黑陷灰白瘡。應腫未爛。俱可救。

天靈蓋 四兩 辰砂 二兩 用袋盛 川芎 二兩 白附 一兩 黃芪 二兩 人參 二兩

牛子 炒二兩 丁香 五錢 陳皮 二兩 甘草 一兩 肉桂 五錢 前胡 二兩 以上水煎

白朮 二兩 肉蔻 五個 煨 俱用水煮 當歸 二兩 白芍 紅花 各一兩

柯肉 八錢 蜜 起陽石 童便煮先 諸藥者。完取靈蓋辰砂研末。

再用陳皮 木香 紅麴 炒 川芎 炒 各射香 五錢 研末共合靈蓋

神砂未和勻。兔血爲衣。全前服法。製法亦同前方。

古有良方。皆因人參價重。醫者遂不肯備。余故設權宜之法。以人參臨時加入。煎湯調服。卽諸藥難製。須預脩靈蓋。辰砂將乳汁童便製過爲末。并後方諸藥之末。脩于囊中。遇此危症。臨時依方。加諸藥煎湯調服。亦未嘗不可。何必膠柱鼓瑟。固執而不通乎。

靈蓋乃諸陽聚會之髓。與諸草木不同。升陽之性。自爲極品。但以人治人。仁者固不忍用。然取已朽之骸而救未死之命。亦猶湯武之用征誅也。然心在救危。則可矣。若以此圖利。則爲神明之所欲惡也。

補元散

治一切灰白不起

黃芪

二兩

人參

一兩

炙草

五錢

紫河車

一兩

梅花

五錢

天靈蓋

一兩

鹿茸

一兩

共為細末

共為細末

血陷之症亦透頂通紅與紫陷相似須要詳辨蓋紫陷屬血熱

治宜涼血為主血陷屬氣虛氣弱不能統血故血僭居氣位

痘乃紅而陷也治此之法以補氣為主須用保元湯人參

黃芪 炙草 加肉桂 附子 川芎 有泄瀉加白朮

肉蔻斷不可投涼血之劑但辨症之訣紫陷屬熱必氣壯身

熱口渴煩燥血陷屬虛必氣緩身涼不煩不渴

起脹難症

發熱 此時尤用厚朴散以退熱以不出者內毒未解急宜解

毒

口渴小便澀

無妨津液上升于痘故也

亂逆

險是毒鬱于內也仍宜解毒兼定心散治之

泄瀉

泄瀉則毒必陷也急用調脾散豆蔻丸止之

乾嘔

毒鬱于中故也急宜解毒

腹脹痰喘

死毒陷內攻也

寒戰咬牙

凶是裏寒也急用桂附理中湯治之

煩悶

毒鬱不宜也宜解毒

大小便血

死毒在內攻臟腑受傷故也

咳嗽 至此宜減不宜加加則毒留于肺也手壓宜于作湯

中加栝梗陳皮欬冬花粉而兼治之

噎水挫脛 無妨此皆咽中有痘故飲食難下也俟內痘厭而

自平矣

失聲咽痛 無妨俱肺管之痘起脹阻氣道故音啞心驚咽

中故食痛宜以甘草栝梗玄麥牛子豆根黃芩煎水與咽

一婦人出痘遍身頭面獨容如麻解毒活血總不起脹但出齊

之後熱退人安並無雜症其痘竟不升水亦不行驗驗自後

遂結小痂而愈矣此毒氣本輕但為浮游之火引之散于皮

膚故不結養漿而毒已化也

一見山痘。痘色甚佳。然暗其痘。絕不起脹。隱于皮膚之間。摸之却又得手。至十日上。遂結痂矣。後皮內之痂。落出甚厚。

### 起脹逆症

大抵痘脹一分則毒出一分。至八九日。猶不起脹。又不經消者。無生理矣。

一頭面不起。雖遍身皆起。亦死。蓋諸陽不升也。

一痘不腫起。而肉先浮腫者。不治。毒氣壅于肌肉。而不達于瘡。也不從瘡出。安能化乎。

一痘一片紅。瑣者。須詳察之。若皮內痘形磊落。而未起者。此是血熱宜涼。血化毒痘自起矣。若瘡跡模糊。摸不得手。則毒氣



散漫不能成瘡必不可治。

又有脚地不紅而不起者亦要看皮下之瘰癧、顆粒分明摸之碍手磊磊于中則是氣血兩虧用千金散托之自起若色黑暗而形糝糊摸之絕不得手則毒潛內留不得成瘡定不可治。

又有瘡未起脹而頭目先腫者令大頭瘡宜散陽分之邪急用救苦散服此不應者死。

羌活 防風 牛子 桔梗 荆芥 川芎 人中黃 連翹 芩 甘草

一痘發而目不閉者以毒未盡發不甚腫脹蓋不開也急宜散。

毒痘起則可救亦用千金內托散托而不起者死

又有先前目閉至九日十日忽然腫退目開者此毒氣倒流入裏以爲內攻之禍急用內托散托出毒氣目復能閉可治不閉則難救矣凡痘稠目閉者必十二日毒退目開乃正期也以前開者俱是凶兆

凡痘黑不起于燥不潤慘暗不明者不治

凡痘黑而落陷者死在八九日內

凡痘遍身黑陷悶亂不寧神昏氣潰者不治

凡痘間有紫黑泡刺出黑血旋而處處有此泡者毒熾而血死也不治

凡痘遍身紫點如蚊所咬者不治

凡痘灰白不起漸成塌陷。慘淡不明。膨脹不食。氣促神昏者卽死。

凡痘灰白頂陷。內外俱有紋路。而根寒血散不聚。此氣不充而血不附也。更加泄瀉。不思飲食。則脾胃中虛。其死必矣。

凡痘灰白頂陷。而腰腹大痛者。腎氣已敗。而毒入內攻。也不治。一痘當起脹時。啼哭不已。日夜呻吟。煩渴悶亂。狂言妄語。如見鬼神者。因此毒盛鬱中。而不能達也。余亦曾遇此症。乃用猪尾血水片五川甲三分硃砂三分三味爲末。又以人參三分前湯共尾血調與服。其心稍明。其人略安。而痘漸起。後補劑中乃

論起  
脹灌  
膿之  
期  
論痘  
所以  
必要  
成膿  
之故  
論毒  
不化  
之弊  
痘至  
此時  
生死  
定局

莫可誰何。醫若救焚。豈可緩乎。

灌漿三日調治法

凡痘至七日宜灌。八日宜滿。九日十日乃漿期也。初出是血。其  
後血化為水。水化為膿。至于成膿。其毒方化。然必漿滿。毒乃出  
盡。必漿膿。毒乃化盡。痘雖起脹。若不成膿。則毒雖出而未化。勢  
必擾攘于皮膚。倒流八裏。故在外則為痒。在內則為內攻。而  
痘瘡抓碎。滿面無皮。腹脹喘急。音啞痰鳴。不可救矣。是以人之  
生死判于膿之有無。有膿則生。無膿則死。理必然也。此灌膿三  
日之中。乃生死存亡之界。此際可不慎乎。然膿之所以不成者。  
皆由五六日前失于解毒。以致毒壅而熾。血燥而凝。氣滯而餒。

推不  
成膜  
之故  
論此  
時治  
法所  
宜必  
用  
補之  
商

行氣  
藥  
藥

故不能運化以成漿也。然至九日十日以來，內臟空虛，候當用補且正氣，與毒氣相持已久，至此元氣必衰斷，以扶元為主。况痘為臟中之毒，既斬關破壁，出于皮膚臟腑，必為不固。若不內托以衛元神，則方出之寇，恐復乘虛而入。此倒陷倒靨之所自來也。至于倒陷倒靨，則毒返內攻。雖有良醫，莫能救矣。故時至九日，總宜溫補，不敢清涼固肌。內托是此時之要領。健脾補氣，為此日之綱常。人參黃芪乃助氣行漿之要藥，當歸善于補血，欬行氣，須用酒洗。恐滑泄，則土炒為宜。鹿茸最善攻漿補血，而又能助氣。酒酥元是良方。白芷排膿止痛，行漿劑中必用。用葛提氣行血，起脹方內宜加。欲歛血以成漿，功莫勝于白芍。欲膨

此言時之  
是又所  
治法

陰而活血勢必用平元枝攻毒排膿在用甲起漿灌汁意淫羊  
丁香煖胃又攻漿肉桂扶陽而補氣木香行氣且行膿山查健  
脾兼散積白朮淮山乃除泡實漿之聖藥凡漿清皮薄者非此  
不能解其厄附子干薑乃煖胃興陽之上品凡咬牙寒戰者非  
此孰可救其危人牙雖然性烈亦起痘之奇方天蓋雖不忍用  
是救危之至寶泄瀉若來則尤芩柯蔻力健脾而不畏嘔吐或  
至則參砂丁霍宜溫胃以爲良至此虛症若形任是辛熱之劑  
總投之而不惧縱或稍形熱症亦不敢純用清涼石羔大黃慮  
傷脾固不用前通猪澤恐利水而乾痘漿雖熱毒未清祇用雄  
黃牛子凡芩連枝栢戒之切莫輕試恐臟寒而告變須臾即或

能治  
難症  
要訣

偶中風寒用薑附桂枝而發汗凡薑獨柴荆升防蘇葛走表散  
氣之藥慎之切莫妄行慮表虛而變症旋生若咳嗽痰涎秋冬  
白附桔梗陳皮可用而川貝胆星清痰之藥休行忽然驚譫狂  
言莫謂此爲實熱妄作驚風施治而用清解之劑此是血耗神  
馳只宜養心補血歸脾湯而得其宜又有足攣手戰勿謂風生  
手足而用驅風較藥此亦氣血有虧而不能榮四體必大補湯  
加續斷以滋筋血之榮腹痛多爲不吉平胃散是良方任他腫  
脹總無妨只要痘疹肥壯七孔流膿不怕此是內中有痘子今  
潰出膿漿大便或瀉膿血亦非腸胃有傷皆因腹中有痘痘潰  
不要驚慌調脾解毒最爲良五苓散加牛蒡他如口渴身熱

此言

此下  
此言

作漿之本症偏宜用補切勿投涼號啼叫痛是行漿之吉兆最  
喜作扁切忌發癢痛則其漿必成痒則其毒不化頂尖脚聚是  
氣血之調和知其漿之必滿便不滑利是脾土之堅剛勿慮膿  
之不成試觀痘形外明內暗則其行漿已實粗肥堅硬喜其中  
氣不虛由白而黃其漿已熟紅暈漸小其漿已行至脚不紅而  
癢蒼蠟此是成功之地見此喜出肩端其後總無變症面部漿  
充遍體之膿雖有三分未足吾知生氣已成頭面蒼黃四肢漿  
即清稀斷不至于死地若其痘也內外俱明其中必含清永起  
而不潤其內必是空痘脚漸澁而暈漸散此為平易頂漸平而  
中漸陷毒入肉攻皮易破而痊愈甚豈能外化最忌灰白而伏



太難紫黑爲殃。疔生古上最難當。人在其魂已往。抓破並無膿血。十兒九個必亡。若還復堆膿汗。結聚猶帶赤黃。此症尚爲可救。急用內托之方。汁精形如雞鶩色。灰枯而不光。抓破大肉之兆。十三日見關王。九日十日腫忽退。此兒端的赴泉鄉。十一日間聲忽啞。丹田氣絕必傾亡。喘噓而兼腹脹咳甚。而且痰鳴。或泄瀉不留。停藥物直下死症。糞門如同竹管。將來定赴閻冥。吐瀉蛔虫必死。此其臟腑已傾。遍身魚泡死堪憐。皆是勿療之症。若見如此之候。何須問用精神。

凡治痘之法。須宜預慮。莫待變症而始惶惶。故發熱之初。當爲出痘之計。見點之日。宜思起脹之議。山齊起水。卽要立行換之。

地毒聚之不行。多由毒之內滯。毒之不滯。必解于七日以前。若以前失于解。遂至九日以後。不敢清涼。明知毒入內攻。而亦難于救藥。故犯痘之家。必于六日以前。宜急請醫調治。勿遷延以致自誤。治痘之醫。當于七日之內。速爲力救。危亡姓急。忽以致誤。人若至九日十日以往。而始慌忙求治。則蝕苗已稿。即有甘注。亦何益乎。余所以痛心疾首。而爲天下告戒也。

### 灌漿順症

至九日十日爲灌漿之期。其痘圓滿光澤。而有膿。裏着其毒。所化而漿行也。色如綠水。而漸變蒼蠟。將手按之。其皮堅硬。身體溫和。二便如常。飲食能進。並無雜症者。順候也。不必服藥。但節

飲食謹風寒避穢氣慎起居而已

痘至九日面上卽帶漿脈其漿漸升其盤漸小其初則如葡萄色其後則如黃蠟色而根腳漸收紅暈則漿熟矣頂明黃漿則漿滿氣充此順症也

痘至起脹腹中作飽不思飲食是毒猶滯于內也若知饑餓貪慕飲食是毒不內留盡皆發出臟腑清快而又空虛乃吉兆也一痘中雜症皆因內毒滯留而化未盡故或擾于肌膚或擾于臟腑而乃變亂不寧也若雜症全無則毒化已盡又何慮乎

灌漿險症

一痘起脹雖光潤可觀然以手摸之軟而皮皺者此陽氣不通

而藥不實後必不能收斂 又凡白欲成場陷者俱用

人參 黃芪 白朮 鹿茸 川芎 當歸 肉桂 分

淫羊藿 山甲 炙甘草 木香 加黃豆引

片痘未甚起脹而漿不泄者用七真湯

淫羊藿 人參 川芎 黃芪 川芎 當歸 水香 分

炙草 加鹿茸 糯米黃豆引

凡痘皮薄者清血宜補 脾為主用實眼散 失治則發瘡

實眼散

人參 黃芪 白朮 淮山 當歸 川芎 白芷 分

肉桂 分 川芎 分 山查 分 陳皮 分 鹿茸 分

一痘頂陷無膿或服內托之藥而反不起者必氣足而血凝也

宜用當歸活血湯

當歸 川芎 赤芍 生地 紅花 紫草 加升麻

人參 白芷 干子

一痘遍身起脹灌膿忽然變色者不可不察變白屬虛宜用千

金散變紅變紫梔角當歸活血湯加入中黃人參

一痘起脹俱好至八九日大便忽秘常欲便而不能傾裏急而

後又重者宜破氣利滯用歸尾枳殼各三錢紫草各二錢生地各二錢與

服即通此餘熱下注大腸若不急治忽發熱而死即不然其

後亦成痼

一痘破成坑者亦內陷也急服內托散托出毒氣外敷

**白龍散**

即乾牛尿燒灰為末也

一痘灌膿時外領起脹其痘或軟其色乾枯內中並無漿汁此

為空瘡最危候也此血枯氣弱毒將內陷宜用 鹿茸 錢二

人參 錢一 黃芪 錢二 當歸 錢三 淫羊藿 錢一 白芷 錢一 肉桂 錢一 川芎 錢六

川芎 錢四

一痘灌膿時頂平脚濶此塌陷之症若不急治必發痒抓破毒

陷內攻而死此氣虛不能領血以致毒血漸散不能聚化成

膿也宜補氣斂血為主急用 人參 錢二 黃芪 錢四 川芎 錢一 白芍 錢一

錢當歸 錢二 川芎 錢六 肉桂 錢一 羊藿 錢一 虫退 錢四

一元虛毒盛而虛火上炎咽痛鼻衄難在溫補而又不  
者須用參麥清補湯

人參

八分

麥冬

去心一分

花粉

酒蒸黃芪錢各一分

前胡

牛子

各六分

麥葦

葦葦

各三分

白芍

八分

芍歸

八分

紅花

川芎

生地

各三分

桔梗

三分

山查

五分

灌漿雜症

發熱

無妨痘出齊三日則宜退熱至作漿時身又宜熱身不

熱則膿不成但發痘之熱熱從裏出以手按之愈按愈熱作  
漿之熱熱在肌膚故以手按之初按則猶熱久則不覺其熱  
也在其身熱不可視為熱症偏宜用補不敢用涼

作渴 平常瀉漿之時津液盡行于痘以爲漿汁安得不渴渴亦要進辛熱以爲作膿之計。

咳嗽 險從前有嗽至此熱出皮膚其嗽已宜退矣。若猶咳嗽是肺中尚有客熱也。宜于內托劑中加款冬陳皮桔梗倘嗽而愈甚而痰涎壅盛痘又無漿則毒火攻肺將變失聲其危甚矣不可視爲庸常也。

痘痛 吉氣血盡升其瘡脹滿尅化成膿焉得不痛。痘愈痛者漿愈升此所以爲吉兆也。有以白芍磨酒與服可以止痛者然亦不必施治。

作痒 凶皆毒氣欲化不化以擾攘于皮膚故發痒也。此際發



痒甚是不祥。然所由來亦有數端。不可一例施治。一有氣虛不能化毒而痒者。其痘必白而頂陷。皮薄而漿清。精神困倦。二便頻利。此氣虛也。宜用參芪內托散。人參 黃芪 當歸 赤芍 川芎 厚朴 防風 桔梗 白芷 官桂 紫草 木香 虫退 或四君子湯加 黃芪 豆蔻 肉桂 白芷 虫退以主之。有血熱而作痒者。其痘紅紫。作渴。此毒盛血熱而痒也。須用四物湯加 人參 白朮 丹皮 運喬 虫退 白芷 紫草 紅花與服。外用 紫草 甘草 黃芩 紅花 生地 牛于煎油與搽。其痒自止。所狐破者。以敗草散敷之。其方用久年蓋牆屋草洗淨晒乾。

未加荔枝壳及草紙燒灰存性。或加麥麩炒黃土爲末。搽之。  
又或以蜜水調活石澗之。又或用乳香敗荷葉茵陳燒  
烟薰之。亦可止痒。又有泄瀉後正氣內虛邪氣外實而作  
痒者。用調元托裏湯。人參 黃芪 柯肉 陳皮 防風。  
荆芥 赤芍 木香 薑炭。引外用茵陳 白芷 燒烟薰之。  
又以荆芥穗燃火刺其痘頂。以散火邪者。有因穢氣所  
觸而作痒者。用內托散。或平和湯主之。人參 黃芪 當  
歸 川芎 白朮 木香 丁香 乳香 防風 炙草與  
服外用檀香 紅棗核燒烟薰之。則穢氣解毒氣升而痒止  
矣。一法用舊絹衣長袖者。令兒穿之。縫其袖口。或軟絹作

袋裏兒之手令不得抓。痘瘡發痒最爲惡候。故詳陳諸家之方以脩察用。如用諸法而痒止者吉。如不止者必凶。痘瘡破則洩其氣不能成漿。必破而旋出膿汁。堆結成痂。紅潤光亮者。謂之補漿。猶爲可治。若破而乾燥無膿血。或汁出堆結形如雞屎色。灰而枯。扭頭擦而其痒不止者必死。

**吐瀉** 喉痘之成。漿全要脾胃堅固。吐則胃弱。瀉則脾虛。方起脹時一經吐瀉。痘即落陷。急宜健脾溫胃爲主。**吐者**用參砂和胃散。瀉者川參朮散。或七味豆蔻丸。

**參砂和胃散**

人參

砂仁

半夏

各四

白朮

茯苓

各五

香

陳皮

各三

參茸二煨姜引

參耒散

白朮錢一 人參 茯苓 砂仁 炙草 以仁 蓮子 神麩

山查各五 肉蔻 柯子 陳皮各四 木香三

七味豆蔻丸

肉蔻 柯子 砂仁 木香 龍骨古方各五錢余用肉蔻一兩柯砂八錢木龍四錢

赤石脂 枯礬各錢

一兒當起脹滯漿時泄瀉不止余用參耒豆蔻諸方俱不效甚至人參豆蔻每服一錢亦不效余謂健脾之藥莫此為甚而不效者何也乃往視其兒面黃色青綠余始悟曰肝屬木木

色青綠。必肝盛尅脾故也。治當削肝為主。乃用白芍六錢。白

朮八分。茯苓八分。以仁山查。陳皮。炙甘草。各三一服立止。

**腹痛**。陰此時募出皮膚。不宜痛矣。若痘陷漿清。則募入內攻。

最危候也。若膿滿漿足。則為風寒食積所致。用平胃散治之。

方見九散篇。或向未大便為燥糞作痛者。用胆導法。方見前今秘結篇。

便通糞出其痛立止。一見痘已灌漿。忽然腹痛。又非秘結。

余用清平之劑不效。及見其以瓦罐煨雞。知為誤服火氣所

致。乃用清解散一服立平。

**腫脹**。無妨灌漿之時。痘毒盡攻于皮膚。宜其腫也。但要痘起。

惟肉腫而痘不腫。則危也。

消腫開目。腫而至于閉目者。必要到十二三日。痘毒已出。其

腫已成。乃開目消腫。則爲毒化腫消者吉。若九日十日。即開目消腫者。則毒陷內攻。必凶。

謔語

此是血虧神亂。故有是症。宜用歸皮湯以補血寧心爲

主。切不可認爲實熱。妄用清心降火之藥也。

寒戰咬牙

此是內臟空虛。脾肺兩寒也。急用桂附理中湯治

之

便血

無妨。此是腸胃有痘痕潰。故下膿血。勿作痢症施治。宜

用白朮 茯苓 豬苓 澤瀉 牛子 血茹 肉桂

血茹卽髮灰。

諸般出膿

無妨行漿之際有眼耳出膿鼻竅流膿口吐臭膿

者皆其內中有痘不能結痂潰而出膿不必施治內痘成膿則毒已化自可無虞

咽痛

險外痘出齊則內痘起脹至外痘灌漿內當收靨改七

八日前痛者則內痘作痛無妨至此痛宜漸退若至十二日而痛尤甚者則毒留于肺肺中痰火熏爛咽喉最危候也用牛子桔梗豆根射干黃芩甘草煎水與嚥痘若下陷則必死矣凡挫喉嚨水俱如此論

失聲

危七八日前則是肺管有痘阻礙氣道十二三日失聲

則是毒陷內攻肺氣將絕其危甚矣然痘未甚昭急用內托

大補元氣氣旺痘升其聲必復

水泡

（臨痘雖起脹而不成漿其內一包清水乃水泡也此是

脾氣虛而肝木盛土不能制其水故水不能化膿豈以平肝

健脾為五用人參

五錢

黃芪

一錢

白朮

二錢

淮山

二錢

茯苓

一錢

白芍

二錢

以仁

錢一

香

九分

半夏

七分

白芷

一錢

肉桂

八分

鹿茸

一錢

當歸

一錢

泡大純是清水者以針刺去其水雖百餘顆亦盡搽之外用

除泡散敷之內服前方雖刺破者仍復灌膿要時時詳看有

清者又刺去之若不刺去則遍身之痘盡成水泡則難治矣

頭面身軀有漿惟膝下之泡則無妨有逆身如魚泡者則必

死也除泡散滑石

二兩

白朮

五錢

白芷

五錢



黑泡

危此毒盛血熱而血不能化毒也見此急宜刺破令

出血水以拔打散敷之

方見散條

有刺去而旋生者旋復刺之

要時時看視不然俱變此泡矣然紫者猶或可救黑泡則必

死矣內服扶元活血湯

人參

黃芪

白芍

茯苓

紅

花

元支

白芍

白芷

虫退

牛子

蘇蘇

川甲

流涎

噤口角流涎不止者乃胃弱也急用參砂和胃散治之

不然恐胃弱不能行藥而變咬牙之症則難治矣

不食

凡八九日前毒未出盡不思飲食故其宜也至此毒宜

盡出內臟空虛當大進飲食矣而猶作飽脹者必毒留內滯

脾胃已敗不亦危乎急用人參黃芪山查白朮下存肉桂

真等藥大煖脾胃。若痘起有膿。飲食稍進。可治不熱脾分。賴之官週身血氣賴之以資其根。既斷血氣何生。雖或起脹亦虞其必倒陷倒壓而死也。

手足牽引

無妨痘若起灌此等或為血虧或為肝風蓋肝屬

筋牽引有如鷹爪者必筋血不榮而肝動生風也。當用祛風

滋血湯。

黃芪八分當歸二錢白芍二錢元支錢六分芍藤錢一煨出

條白木錢二川芎四分官桂六分

筋骨疼痛

無妨痛而紅腫者是餘毒也痛而不腫者是風疾

也。且餘毒不發於灌漿之日必發於收結之時。此時作痛而

不紅腫者必為風寒所襲而秋冬之時多有此症。宜用薑葱

灰麴以燒酒炒溫而熨敷之以散其風邪內服生芪 當歸  
川芎 白芍 防風 勾藤 石南藤 白芷 碎補  
續斷 薄荷 五加皮 蠶 蠅退 獨活 人參 煎酒與  
服服後運擦痛處令藥性行于此地

中風 可治痘當灌膿時其痘皆好忽一時禁口直視痘皆變  
為瓦霜色者是中風也。不必驚慌。急用生薑汁灌下仍用干  
薑附子官桂喉中有痰則加半夏。溫服令出微汗即愈。

**催漿**

攻漿起陷之法莫詳於五陷之條。但有方書未載而食物亦可  
攻漿者亦備言之。雞冠血。久年老雞及雞爪。人乳。

羊肉 野豬皮及蹄爪 藹豆作藥引 糯米作藥引

倒陷 凶危痘既圓。疊起脹而復陷者。名倒陷也。倒陷之症。表

裏皆虛。有因泄瀉而倒陷者。用人參 黃芪 白朮

茯苓 柯子 豆寇 肉桂 附子 木香 丁香 有因

清解太過而倒陷者。是氣血兩虛也。用人參 黃芪

歸 鹿茸 川芎 白芍 肉桂 淫羊藿 炙草 有因

風寒所沖而復陷者。則以散寒扶氣為主。宜用人參 羌活

川芎 枳梗 升麻 生芪 炙草 生薑引 有因穢氣

所觸而倒陷者。宜補氣解穢為主。宜用人參 炙芪 當歸

川芎 白芷 肉桂 乳香 丁香 藿香 木香 仍用

一 棗核檀香燒烟薰之治倒靨之法亦如是

灌漿症

凡痘紫黑慘暗千枯塌陷者不治

一 諸痘有漿而天庭不起千枯而陷者不治

一 天庭之痘如沸水漉皮漸延兩頰去水而千似靨非靨者死

一 頭面甚腫瘡皆抓破臭不可聞者死

一 面腫早退瘡陷無膿目無神光者死

一 漿不充實不肯結痂而渴瀉寒戰者危用桂附理中湯或可救

一 灌膿時身反大熱而煩渴者用參麥湯

一 頭上稠密身上稀疏痘色淡白不能起痂者氣血兩虛也宜

用千金散方見九散條加升麻四肢不起加白木桂枝

一滿身無皮流水不止者此爛痘也內服實癰散方見外用散

草散除泡散敷之或茶葉方多取茶葉揀去粗梗入水一

煎取茶葉鋪于床上用草紙隔一層灸其上二夜膿水盡乾

一痘灰白皮薄擦而即破者不治

一痘皮薄無膿純是清水形如水晶者不治

一痘二便秘結腹脹聲啞肌肉焦黑目閉無魂者不治

一痘爛無膿吐瀉不止二便下血乳食不化者不治

一痘頂不起脚漸散潤平場干燥此爲倒靨多不可救

一灌膿之際而面部諸處卽有干枯腐爛者亦爲倒靨不治。  
一抓破之瘡復與肉托亦不割膿不補藥目開腫消是毒入內  
攻也必死。

一瘡頂有孔漏出膿水推結手枯而色灰白如天癰瘡及癰頭  
之形者名漏瘡也不治。

一起灌之時忽舌上有黑點此疔生舌上也不治。

種痘新書卷之八

寧邑張 琰遜五氏編輯

受業曾衡波全泰

結痂辨症賦

痘至十三四日。漿行飽滿已。宜次第收功。若遇身發大熱。停漿不易結痂。此則陽元陰虛。引以清涼收斂。漿足而或氣喘。此症恐為痰壅。痂成而忽爾發驚。必因小便秘滯。若或虛氣而陷。弱倒壓而黑焦。一則溫補而或興。一則攻發而或活。泄瀉安寧。太虛少毒內潰。則下膿結臟毒。必然便血。挫喉聲啞。漿行飽滿亦無妨。痒塌咬牙。便實聲清。猶可活。腐來痂硬。變症終無。花脫如



茲須愁餘毒蒸發或致太過。潰爛難爲收拾。身熱若燄。入泡  
發燎。漿可畏。空遺痘壳不成。痂只爲漿情執重。脹喘虛而弱。  
壓皆由毒入內攻。痘雖未見黃膿。痂死却如血赤。若曾解毒十  
先此症。斷知美極。胃氣絕。則口唇硬腫。肝熱盛。則目睛眇白。臨  
盡發於瀉後。總是氣虛而斷。泄瀉繼以煩渴。豈爲實熱而然。泄  
瀉而煩渴不止。理必可以升提。好飲而弱渴愈甚。勢必難以援  
救。氣虛寒賦。痘疹無恙。卽溫經漿足難收。便實熱毒須解利。進  
寒涼以助結痂。此補法而防過益。此非灌膿之候。何須純用補  
劑。至此宜防餘毒。縱用清解。何疑餘蒸。倘或蒸毒。亦死依然。難  
結小便。必須滑利。漿汁而始易收。斟酌盡善。因時制宜。方爲得

收結三日調治法

痘至十一二日其漿宜飽宜濃十二三日漿行至足面上漸宜收。歷其膿已熟則漿如黃蠟而腳漸爾不紅。頂心稍濕黃漿已具收結之勢。于是其膿漸乾其痂漸結。總要痂厚赤黃最忌花薄灰白。既于面部先出當于面上先收。準頭先歷是脾胃氣充。日後總無變症。兩頰先收是肺肝氣足。必能次第收功。諸部未歷而地角先焦。此爲腎水早枯。見之且休歡喜。滿面方漿而天庭先歷。此是元陽劇萎。此症甚是堪虞。蓋額頭是爲純陽之所。足膝乃爲純陽之地。面部中庭乃陰陽和會之區。從此先歷則陰陽和暢氣血調勻下漸收。至于足上方歷至頭顱此順候之

常數如是乃可無虞。莫謂痘至此已成功。可以不必調治。更慮  
臟腑空虛。此際反多變症。陽氣不充。則身軀必冷。而痘汁何能  
乾結。脾胃不寔。則肌竅必空。慮癰漿倒入內攻。當此時而用藥。  
宜以健脾利水為主。蓋脾胃強旺。則肌燥而膿易結。小便清利。  
則濕去而汁易乾。又當扶陽固本。為先。蓋陽氣盛。則毒在外收。  
而痂厚貞元固。則毒不倒靨。以為殃。是以人參黃芪為收成之  
要藥。理中桂附乃結局之良方。此日半間血熱之症。故紅花生  
地紫茸丹皮一切涼血之藥。皆退處屏藩。非急用之上將。惟茯  
苓白朮以佐淮山。一切助脾之品。皆置之左右。為應用之將軍。  
澤瀉猪苓常川。木通車前得宜。附子乾薑可使砂仁丁桂堪錄。

身軀微熱。有何疑。磨時水火既濟。名爲燒餅之症。熱乃煉就。痲皮膿乾。身熱自退。不須用藥。維持收磨。過半大熱。則爲餘毒。將興。須用調元化毒。熱退餘毒乃清。凡是接骨之處。餘毒在此。現形。或是爲疽。爲癰。此等安能置命。故任地紅腫。其毒熾。毒出外。攻人不喪。若或陰囊脹腫。腎毒外洩。膀胱若至。倒流入裏。此見頃刻云亡。倘有痰涎咳嗽。陳皮半夏相當。若還聲啞。最宜詳爲看症。瘡何候。聚膿加厚。則無妨。此是氣虛痰壅。上只用開痰補氣。管效聲氣自揚。若聚清而痘爛成倒。磨而搔痒。此等若逢聲啞。不日卽赴泉鄉。手足時常牽引。恐其筋内生風。薑黃白附。乃歸。爲補血祛風。可用。若是拘攣難轉。動血不榮筋氣。不送祇要。

行其氣血自可運用流通。倘來泄瀉。是何因虛。因原分兩症。白  
青滑溜。是脾虛。治此法。當用補。若還黃赤射漂行。此為餘毒下  
奔。不必急為止瀉。毒因泄瀉外行。咬牙寒戰。無害。理中桂附堪  
寧。謔妄不須驚怪。寧心補血為宗。便下血膿。可治。臟毒不致內  
攻。吐瀉蛔虫必死。臟敗。此症難醫。腹痛而兼膨脹。此為餘毒積  
陳。且用消導解。毒痛定而張亦除。只怕痘形倒靨。毒流入裏。甚  
虞牙齒生痒。則毒留于胃腑。將成走馬牙疳。急清胃熱。乃為良  
此時若不急救。數日之後為殃。則見顴崩齒落。月餘齒盡。淪已  
頭自疼痛。則熱犯于太陽。吾知自病將作。勿令珠突毒冒。急退  
土焦之火。清肝解毒。相當此時。如驗生死。總看痘花何樣。痘癰

必要成痂。痂厚亦豈可愛。知其十無一死。遍身俱結厚痂。斷其百有百生。收結若至于膝。此其大功已成。足下雖或死。然亦不致傷生。飲食多進。二便如常。精神清爽。體安康。更喜。瞳人明。期雜症全無。真可賀。請君藥餌。且收藏。若或昏昏好睡。此非目閉神亡。血氣洩之已極。精神豈得如常。只須調養溫補元神。返自安康。頭有膿漿爲主。今觀痂死爲憑。有痂則生。無痂則死。痂厚則毒盡散。痂薄尚有餘殃。雖面部結痂而遍體悉如薄紙。此症猶云難救。上身痂結而腿膝下若竹衣。此等必留餘毒。况面自抓破。遍體無痂。其毒豈不內攻爛。流膿。其症必險。連皮脫去。此症定由一日之間。遍體一齊黑腐。俗云鐵甲焦。詹見此斷。

然不治醫後總無痂疔。此是到醫無疑。遇此何須施治。至于飲食不進。泄瀉無休。喘急氣喘。瞳人已大。自少神光。足冷過膝。肌盡焦黑。唇不蓋齒。舌縮痰鳴。死期已生。醫人若逢此候。萬勿輕投藥餌。恐致傍人之訕。招其父母之尤。

### 結痂順症

痘至十三四日。血盡毒解。其膿漸乾。色如蒼蠟。喉加葡萄色。從口鼻兩旁。人中上下。左右二額。收靨起。乃至地角。頸頂。胸腹腰背。逐漸收下。然後上及額顙。下至于足。逐次收結。痂厚。疔圓。或黃或赤。雜症全無者吉。

痘自人中先收者吉。自元壽先靨者任凶。不凶。蓋人中爲陰陽

交會之所從此先收必陰陽和暢氣血均行元壽乃脾胃中土之區自此先磨則脾胃氣旺自能滋養乎百骸故二處收起必無凶兆若額顙地角及手足心先收則凶此邪火入于心腎故序未及而先萎也所以必凶

髮際以上陽中之陽謂之孤陽足脛以下陰中之陰謂之孤陰孤陰則氣難充獨陽則血難週痘至二處所以遲留而緩磨也必收至足下而後頭顙乃磨耳不必施治

痘漿已足色如蒼蠟而身發熱者此回水之候真陽運化所以身體溫熱蒸燥漿膿其漿乃乾其痂乃結古謂燒盤之痘不必施治倘誤用寒涼以退其熱則由輕而變重矣



一兒痘已成發但元虛體弱忽然發熱作渴其家用三黃湯連進三服即熱退身涼以為得計孰知內脏已虛痘成倒靨竟致莫救良可悲也

收結險症

當收靨之時身體宜溫乃能回水乾膿若身涼足冷而當收不收則陽虛不能收結宜用

和中溫表湯

炙芪 二錢 人參 白朮 茯苓 肉桂 川芎 當歸 以仁

乾薑 錢一 炙草 防風 白芷 丁香 附子 各五分

又有發熱薰蒸而當靨不靨者毒未解也須退其熱則毒自收

宜用

清表解毒湯

全地 麥冬 花粉炒各八分 黃芪 一錢 當歸 八分 牛子 連喬

朱苓 澤瀉 木通各五分 甘草 三分 又方用百沸湯調沙糖

與服名甘露回天飲亦能退熱收結。又膿漿足而當壓不

靨者宜用

回漿散

黃芪 一錢 白朮 二錢 茯苓 一錢 何首烏 一錢 白芍 八分 人參

炙草 四分

象牙散

前方如象牙散 一錢

又有其聚雖充而濕潤難收者亦用回煖散加以仁猪苓澤瀉  
半夏

又有表過痘爛而水流不已者用人參黃芪白朮白芷防風茯  
苓又用

**除濕散**

蒼朮 防風 赤茯苓 猪苓 澤瀉 木通 白芷 白朮

以仁于姜 官桂 外用敗草散敷之 方見前

痘壓至頸或至腰而下身○收靨者此熱毒太盛故也當用  
五苓散加芒旁滑石木通苦大便秘結用

當歸解毒湯

當歸 生地 酒大黃 麻仁炒研 只壳炒 紫草 連翹  
一痘當磨之時忽然灰白頂陷土瀉腹脹寒戰咬牙此脾肺兩  
虛若不急救則毒入內攻而死急用

內助散

炙芪 人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮 生薑 肉桂  
山查 附子 乾薑 痘有水泡則多用白朮茯苓  
一痘當收不收身發大熱狂言譫語喘急氣喘二便秘結煩悶  
作渴者此熱毒乘間入于心肺二經也宜用

清金導赤飲

當歸 白芍 陳皮 石膏 茯苓 炙草 黃芩炒 黃連炒

杏仁炒 桑白皮炒 木通 只壳 滑石 車前 麥冬 人參  
玄參

一痘未稠膿。頂未滿足。而而腫忽退。自閉忽開。瘡肺散。潤皮破。  
乾燥似腐。非腐者。此氣血兩虛。津液枯竭。毒氣不能外散。而  
將流入內。攻最危之候。急用 黃芪 二錢 人參 八分 白朮 錢  
茯苓 一錢 肉桂 六分 牛子 麥冬 連翹 白芍 白芷 八分  
分 此亦倒靨之候。見此之症。卽急以治。或十救二三。若不  
急治。則必死矣。

一痘膿後不能結痂。反成腐爛。和皮脫去者。亦倒靨也。此是  
氣不足。急用保元湯加 當歸 白朮 茯苓 牛子 連

喬官桂 木香治之必其破處復加腫痛手足遍身原無  
痘處復出一層謂之補空所破之處復劑黃汁堆結成痂謂  
之補塊若有如此則可望生如其不然則必死矣

一痘後醫忽泄膿血痂皮者古謂倒靨然毒既下泄不留內攻  
俟其膿痂下盡自然而愈不必妄治若瀉而水熱不分者則  
用陳氏木香散

木香 大腹皮黑豆汁洗淨 人參 赤茯苓 前胡 桔梗 青皮

法夏 丁香 柯肉 炙草 桂心 共為末全豆蔻丸送下

有因難癒為氣所遏而不能腐者宜用

排膿解毒湯 此方欲參則不敢用

桂枝 麻黃炒 赤芍 防風 炙甘草 桔梗 川芎 牛子  
人參 生芪 有因夏月炎大暑氣重熱不能腐者宜用

甘露解毒湯

白朮 茯苓 赤苓 澤瀉 木通 麥冬 生地 連翹

官桂 香薷

一症裏熱太甚一向總不大便而痘不能腐者宜微利之用

當歸解毒湯

生地 當歸 麻仁 牛子 紫草 貝壳 酒大黃 如此

之症當用膽導法更為穩先其法詳四卷利結條

一遍身俱收惟頭足不收者用白朮 茯苓 當歸 川芎

升麻

牛旁 白芍

一多服熱藥以致熱毒猖狂痘爛不靨者用前同藥散加前胡  
牛旁 連翹 麥冬 車前 木通 外用輕粉黃連爲末  
調油搽之 或以芒硝爲末調猪膽汁敷之亦效

一痘取結時有腥臭之氣者是其毒氣洩外也痘多若無臭氣  
則毒氣猶未盡洩其後恐有餘毒然其臭如腐肉令人不可  
近者則毒化未清致有惡氣又急宜清毒活血不然變出非  
常

一有痘破成坑不能合口者用生肌散 或綿繭散敷之  
生肌散



地骨皮 黃連 黃柏 甘草 梔子 柿蒂 共為末

綿繭散

出蛾繭不拘多少。每繭八白礬五分。用火煨過。其礬一兩則加

陀參 五錢 白芷 二錢 為末以蜜調敷。

一疔損破。灌腫作痛。不乾膿水者。名疔蝕。犯着即流血不止。若因循失治。必致潰筋傷骨。穿膜破肌。以殞人之性命。須用

大補湯 外敷綿繭散

黃芪 人參 當歸 官桂 牛子 連翹 甘草 扶苓

一疔頭面損破。反復腫灌。膿血浸淫者。須防壞眼。崩鼻。敗肉。缺唇。宜用。

升麻解毒湯

升麻 白芷 炒芩 牛子 連翹 密蒙花 荆芥穗

防風 桑葉 當歸 甘草節 木通節 加黃芪

一痘當收時身宜微熱。雖不宜涼。然或忽增大熱。發渴煩燥。則其毒未嘗盡化。至此毒火復炎。若不解毒。須防復陷。宜用

調元解毒湯

黃芪 當歸 牛子 連翹 黃芩 花粉 生地 木通

前胡 人參 甘草

一收結時身熱唇紫。連結渣滓。兩頰通紅者。毒乘于肺。其必將發肺癰也。宜用

清金解毒湯

黃芩 黃連 牛子 前胡 丹痧 麥冬 知母 百合

炒枝 甘草 人參

一面上俱未收而耳上之痘先收者毒侵于腎也若不治之則諸痘難收恐成創。耳冷者須用枸杞故並知母

當歸 川芎 白芍 山查 陳皮 白朮 甘草 耳熱

者用 黃芩 黃連 川芎 白芍 厚朴 木通 甘草

一當靨之時身涼而汗不止者此表虛也宜固肌秘勝用

歸芪湯

黃芪 當歸 杏仁 炙草 麥冬 百朮 茯苓

茯苓 炙草 痘層無痂則凶

聲啞

痘層無痂者必死其痘若好則或因氣弱而聲不亮宜用人參黃芪 白朮 茯苓 柯子 五味 炙草 或因痰壅肺道而聲不出者宜用陳皮 桔梗 半夏 欬冬 白附 砂參 茯苓 炙草 豁動其痰聲自開矣

手足牽引

或十指攣縮或聳肩搖足點額搖頭皆是肝經有風蓋肝屬筋筋內有風故牽引攣縮也宜用黃芪 當歸 白芍 為君 茯苓 芍藥 白姜 為臣 天麻 炙草 搖頭點額加川芎 虫退

去金蝎尾 硃砂

手足拘攣

曲而不伸或伸而難曲。艱于轉動者。此是氣血兩虛。血不榮筋也。宜用人參 黃芪 當歸 川芎 白芍 大生地 白朮 茯苓 丹皮 續斷 碎補 虎骨 勾藤 炙草 官桂 前胡 服。若骨內痛而不腫者。是風疾也。于前方加防風 家皮 南藤 靈仙 少許 乳香 沒藥。手用桂枝引。足用牛夕引。若手足紅腫而痛多。在曲腕接骨之處。此是餘毒發作。治法詳于疽也。

手足水今危

此陽氣將絕而不能行於四肢也。若冷過膝，死于目前。

泄瀉無妨

此時泄瀉多是餘毒奔越，不宜驟止。但餘毒下泄者，瀉必有聲。其糞或黃或赤而臭，或直漂射而出，此皆熱注大腸，餘毒因瀉而解也。毒盡其瀉自止。若瀉不止，用五苓散加牛子，水通車前，惟糞青白而瀉滑澀無聲者，乃脾虛也。用參朮調脾散與豆蔻丸治之。若瀉蛔虫，或蛔虫從口鼻而出，俱不治。此勝敗而中不能安也。若瀉膿血，則內有蓄熱，因瀉而解，或內瘡既潰，故下膿血也。必下盡自安，不可止瀉。

飲食

能食則吉，不食則凶。

腹脹而痛

瘕瘕不滿而痼不厚者。因此內留餘毒。故脹痛也。宜用牛子

連喬 山查 神曲 厚朴 陳皮 香附 木香 白芷

炙草 炒芩 有熱加前胡 若瘕濃痼厚。則為積滯。脹痛宜

以前方去連喬黃芩加蒼朮 砂仁 大腹皮

陰囊腫脹

無妨

此腎毒外洩于膀胱也。吉至痘收齊自退。若猶不退。則用蒼朮

扶苓 猪苓 澤瀉 木通 車前 活石 牛子 銀花

瞿麥 以退膀胱之熱而自消矣

昏睡 無妨

氣血盡送子外而元氣未復故昏而聒呼之不醒醒亦復睡不必驚疑元神既復而自安寧

### 潮熱

熱而不甚者乃元陽運化以成結痂之功所謂燒盤之症也。不必服藥。若膿清痂薄而忽然大熱者餘毒將敗欲發癰疽宜用和中之劑或連齋飲弱者用前扶元解毒湯熱退則餘毒解散矣。

### 齒痒或出血

此餘毒留于胃經將成走馬牙疳也。若不急治其後牙齦腐爛。口落一齒。滿口落盡而死。當發痒之時。即宜用連齋。牛子。



慈菰 石羔 生地 銀花 甘草 煎水與酒同服  
服人參 石羔 牛子 慈菰 甘草 黃芩 不過數劑其  
痒與血俱止則無事矣

咬牙寒齲 仍用桂附理中湯

膽諸 只用補血安劑

面唇紅裂

宜內服扶元解毒湯方見前外用紫草 生地 紅花 甘草  
黃芩 黃柏俱生用 牛子 共煎油擦上自愈 或癰後年痒與  
癰成瘡俱可用 又方用細茶搗碎將布裹住即口面上亦

結痂逆症

一遍身赤黃漿。而口唇上下先黃熟而忽焦者。以見此速宜  
剔破。

一未磨將磨時。口唇腐爛唇白至舌者。不治。毒攻于胃也。

一未吃飲食。口中常如食物而動不止者。不治。

一面部胸腹俱未收。而腳先收者。凶。

一遍身臭爛如餅搭者。急用內助散。方見前或可救。然終難治。

一遍身發痒抓破。不見膿水。皮捲如豆莢者。不治。

一痘將磨寒戰咬牙手足搖動。禁口不開者。最危候也。急用人

參 黃芪 白朮 茯苓 附子 炮薑 丁香 肉桂

一收脣時痰壅喘急聲啞目閉者不治

一曰閉腹脹足冷過膝者不治

一曰無神光瞳子不明珠帶痰色者不治

一收脣至頸頂或至胸而不脣下服藥無效者死